Онкогены семейства *тус* как терапевтические мишени

Кабилова Т.О., Черноловская Е.Л.

Myc-family oncogenes as therapeutic targets

Kabilova T.O., Chernolovskaya Ye.L.

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, г. Новосибирск

© Кабилова Т.О., Черноловская Е.Л.

В последние годы происходит интенсивное накопление информации, необходимой для понимания молекулярных механизмов возникновения и развития раковых заболеваний. Полученные знания способствуют разработке новых классов противоопухолевых агентов, направленных на ингибирование пролиферации клеток. В настоящее время для лечения некоторых типов опухолей довольно успешно используются препараты, направленные на специфическое блокирование функции определенных белков, ответственных за развитие опухолевого процесса, например, 2-фениламинопиримидин (Gleevec) [43] — низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназы или, Trastuzumab (Herceptin), — препарат, полученный на основе антител к рецептору HER-2/neu [83].

Важной мишенью для направленной терапии являются транскрипционные факторы, участвующие в регуляции клеточного цикла, так как они стоят в начале каскада сигнальных событий, приводящих к злокачественному перерождению клеток. Гены семейства *тус*, кодирующие транскрипционные факторы *мус*, рассматриваются как перспективные терапевтические мишени, поскольку их повышенная экспрессия наблюдается во многих типах опухолей человека, и имеются данные, что она напрямую связана с активацией пролиферации клеток и их злокачественной трансформацией [30, 34]. Гиперэкспрессия гена *c-тус* наблюдается в таких опухолях, как миеломы, лимфомы, карциномы, нейробластомы, повышенный уровень мРНК гена *L-тус* выявляется при раке яичников, в то время как *N-тус* играет ключевую роль при развитии ретино- и нейробластом [121]. Тради-

ционные схемы лечения нейробластом, а также некоторых других типов опухолей включают α -интерферон и ретиноевую кислоту, которые оказывают ингибирующее действие на экспрессию генов семейства *тус* и индуцируют дифференцировку опухолевых клеток. Однако при наличии мутаций в регуляторных районах генов *тус* опухоли проявляют резистентность к такому лечению [127].

Разработка препаратов, направленных на ингибирование онкогенов семейства *тус* является важным направлением в противоопухолевой терапии. Серии экспериментов показали, что индукция экспрессии *тус* в гематопозитических клетках [44], молочных железах [32], печени [135], коже [5, 135] и в островках Лангерганса [117] приводит к злокачественной трансформации клеток, тогда как ингибирование экспрессии *тус* в большинстве случаев вызывает регрессию опухолей [72].

Сегодня существует ряд стратегий, нацеленных на блокирование функции *мус* в опухолевых клетках: одни из них направлены на ингибирование экспрессии генов *тус* на уровне транскрипции или трансляции, другие — на блокирование белок-белковых взаимодействий, необходимых для выполнения функции *мус* как транскрипционного фактора, например, образование *мус*/MAX гетеродимера. В настоящем обзоре рассмотрены различные стратегии, направленные на ингибирование функции *мус* в разных типах опухолей.

Гены семейства *тус*

Семейство генов *тус* человека объединяет шесть генов: *с-тус*, *N-тус*, *L-тус*, *S-тус*, *B-тус* и *P-тус*. Известно, что активация генов *с-тус*, *N-тус* или *L-тус* приводит к злокачественному перерождению клеток [34]. Гены *S-тус* и *B-тус*, напротив, кодируют белки, ингибирующие злокачественную трансформацию клеток [8, 126]. *P-тус* является псевдогеном, образовавшимся из участка гена *L-тус* [34].

В данном обзоре более подробно рассмотрены протоонкогены *с-тус*, *N-тус* и *L-тус*. Они обладают сходной топологией: имеется основная рамка считывания, высокогомологичные районы генов чередуются с уникальными последовательностями. Транскрипты генов *с-тус* и *N-тус* состоят из трех экзонов, включая первый нетранслируемый экзон, тогда как транскрипт *L-тус* подвергается альтернативному сплайсингу и полиаденилированию по различным сайтам с образованием нескольких видов мРНК [79].

Все три гена в норме экспрессируются на эмбриональной стадии развития, а в тканях взрослых особей экспрессируется только *с-тус*. В нетрансформированных клетках *с-мус* участвует практически во всех каскадах, передающих пролиферативные или антипролиферативные сигналы. *с-тус* является геном раннего ответа на воздействие митогенов, активация его экспрессии необходима и достаточна для вхождения клетки в *S*-фазу клеточного цикла (*G1/S* переход) [129]. Кроме того, *с-мус* играет важную роль при переходе клетки из *G2-* в *M*-фазу клеточного цикла [1]. Как *с-тус* мРНК, так и считываемый с нее белок характеризуются коротким временем жизни (примерно 0,5–1 ч) [31, 58, 125], что, вероятно, необходимо для быстрой и точной регуляции экспрессии данного гена.

В большинстве типов опухолей человека наблюдается нарушение регуляции экспрессии протоонкогенов семейства *тус*, связанное с генетическими изменениями. Злокачественное перерождение клеток может происходить в результате амплификаций, хромосомных транслокаций, вирусных инсерций и мутаций в кодирующих или регуляторных районах, которые приводят к усилению экспрессии генов *тус* [107]. В

91% случаев лимфомы Беркитта наблюдается транслокация гена *с-тус* под энхансер генов иммуноглобулинов, что обеспечивает высокий и постоянный уровень экспрессии этого гена [16]. Транслокации, затрагивающие ген *с-тус*, также обнаружены в таких опухолях, как диффузная крупноклеточная лимфома, острая Т-клеточная лейкемия и миелома [107]. Амплификация гена *с-тус* или нарушение регуляции его экспрессии также обнаруживаются во многих типах опухолей, включая меланомы, рак молочной железы, рак предстательной железы и рак кишечника [30, 107, 123]. Амплификация гена *N-тус* является ключевым моментом в развитии нейробластом [132], ретинобластом [85], медуллобластом [120] и глиобластом [27, 65], в то время как *L-тус* часто амплифицирован при раке яичников [160]. Все три онкогена семейства *тус* могут быть амплифицированы в клетках карциномы легких [107]. В последние годы становится понятным, что нарушение регуляции генов семейства *тус* не ограничивается крупными генетическими изменениями, такими как транслокации или амплификация, но также может быть результатом мутаций в промоторных районах генов *тус* [54]. Другим механизмом усиления экспрессии является стабилизация *тус* мРНК за счет добавления или потери последовательностей в 3'- или 5'-нетранслируемых районах [13]. При некоторых видах лимфом наблюдается стабилизация белка *мус* за счет мутаций как в самом белке, так и в белках, участвующих в его деградации [73].

В норме экспрессия генов *тус* регулируется определенными внеклеточными сигналами (например, митогенами), нарушение регуляции этих генов приводит не только к активации клеточной пролиферации и злокачественной трансформации, но и к индукции апоптоза, геномной нестабильности, усилению ангиогенеза и блокированию дифференцировки [61, 96, 109, 130, 131]. *мус* играет ключевую роль в поддержании плюрипотентности эмбриональных стволовых клеток [114, 151]. Так, трансдукция клеток фибробластов кожи транскрипционными факторами Oct3/4, Sox2, Klf4 и *с-Мус* приводит к их перепрограммированию в плюрипотентные стволовые клетки,

способные дифференцироваться в клеточные линии всех трех зародышевых листков. Недавно в литературе появились данные о способности MYC активировать не только пролиферацию, но и дифференцировку эпидермальных стволовых клеток [156] и первичных В-лимфоцитов [56]. Возникает вопрос: каким образом MYC регулирует такие разнонаправленные процессы в разных типах клеток? По-видимому, клеточный ответ зависит от продолжительности и степени активации экспрессии MYC, которые, в свою очередь, регулируются действием многих транскрипционных факторов и кофакторов [156].

Структура белков семейства MYC

Белки MYC относят к суперсемейству транскрипционных факторов, содержащих участок b-HLH-LZ (основной участок, спираль — петля — спираль, лейциновая молния) [95]. MYC содержит два домена: N-концевой трансактиваационный [78] и C-концевой гетеродимеризационный [11]. В состав C-концевого домена входит участок b-HLH-LZ, необходимый для связывания MYC с его ближайшим партнером — белком MAX, также содержащим b-HLH-LZ домен. Димер MYC/MAX способен специфически связываться с ДНК, содержащей коровую гексануклеотидную последовательность CACGTG (E-бокс) [15]. Кроме того, C-конец белка содержит сигнал ядерной локализации, необходимый для транслокации MYC в ядро, где он и выполняет свои функции как транскрипционный фактор. N-конец представляет собой регуляторный домен, отвечающий за сборку транскрипционного комплекса [111]. В N-концевом домене находятся несколько высококонсервативных последовательностей, называемых MYC-боксами (MBI-III), которые совместно с C-концевым b-HLH-LZ доменом и являются отличительной особенностью белков семейства MYC.

Регуляция транскрипции белками семейства MYC

Для функционирования белка MYC как транскрипционного фактора необходима его димеризация с белком MAX, высокий уровень экспрессии которого наблюдается во всех типах клеток, однако в отличие от генов семейства MYC,

гиперэкспрессия гена *max* не приводит к злокачественной трансформации клеток млекопитающих [103]. *In vitro* показано, что могут формироваться как MAX/MAX, так и MYC/MAX димеры, но эффективность образования последнего комплекса намного выше. Это связано с тем, что гомодимеры MAX/MAX образуются только за счет полярных взаимодействий, тогда как MYC/MAX гетеродимеры формируются при участии более стабильных ионных взаимодействий между α -спиралями в LZ-районах [104]. Данные рентгеноструктурного анализа показали, что MYC и MAX образуют антипараллельный тетрамер, состоящий из двух MYC/MAX гетеродимеров [104]. Константа ассоциации такого тетрамера настолько высока, что даже малые количества MYC/MAX комплексов *in vivo* существуют, вероятно, в виде тетрамеров.

Активация транскрипции реализуется при связывании гетеродимера MYC/MAX с последовательностью CACGTG (E-бокс) в MYC-регулируемых промоторах [15]. Гетеродимер при этом активирует ацетилирование гистонов, взаимодействуя с ацетилтрансферазами GCN5, TIP60 или p300/CBP, что приводит к локальным изменениям степени упаковки ДНК в хроматине [28]. Также в комплексе с E-боксом MYC/MAX активирует элонгацию транскрипции, осуществляемую всеми тремя РНК-полимеразами (RNAP I, II и III) [4, 40, 52]. В случае подавления транскрипции MYC/MAX формируют комплекс с белком miz1 или с другими транскрипционными факторами. Эти комплексы обладают другой специфичностью и узнают последовательности в промоторах других генов [134, 147]. Как и активация генной транскрипции, MYC-опосредуемая репрессия может осуществляться через регуляцию активности комплекса RNAP II [10].

Следует отметить, что гомодимеры MAX/MAX действуют как конкурентные ингибиторы гетеродимеров MYC/MAX [3]. Было показано, что гиперэкспрессия MAX в клетках млекопитающих приводит к уменьшению экспрессии репортерных генов, содержащих E-бокс, и к супрессии MYC-

индуцированной трансформации [55]. Супрессорное действие *Max* также проявляется через взаимодействие с альтернативными *b-HLH-LZ*-содержащими белками, такими как *MAD1* [9], *MXI-1* [163], *MAD3*, *MAD4* [67] и *MNT* [66], которые в составе димера также связываются с последовательностью *E*-бокса и являются антагонистами *MYC/MAX* комплексов [15].

Нетранскрипционные функции белков семейства *MYC*

Недавно в литературе появились данные, указывающие на существование функций *MYC*, не связанных с регуляцией транскрипции. Так, введение мутаций, нарушающих связывание *MYC* с ДНК или с его ближайшим партнером *MAX*, не блокировало способность *MYC* активировать клеточную пролиферацию [29].

Примером нетранскрипционной активности *MYC* является его способность повышать уровень трансляции определенных мРНК путем активации метилирования 5'-концевого гуанина мРНК [26]. Другим примером является непосредственное участие *MYC* в процессе инициации репликации ДНК [37]. Обнаружено, что *MYC* связывается с компонентами пререпликативного комплекса и локализован в ранних сайтах ДНК-репликации (*origin* репликации). Эти данные указывают на возможную способность *MYC* непосредственно контролировать инициацию *S*-фазы независимо от его транскрипционной активности.

MYC как терапевтическая мишень

Белки семейства *MYC* являются важными терапевтическими мишенями по ряду причин. Во-первых, на некоторых типах опухолей (остеосаркомы [71], лимфомы [44] и опухоли поджелудочной железы [117]) показано, что временное снижение уровня *c-MYC* приводит к остановке клеточного роста, апоптозу и регрессии опухолей. В остеосаркомах ингибирование экспрессии гена *c-тус* приводит к дифференцировке опухолевых клеток в остециты, а после его реактивации наблюдается массовый апоптоз клеток [71]. Таким образом, в отличие от

традиционной химиотерапии, не исключающей возможность рецидивов, возобновление экспрессии *MYC* может приводить к дальнейшей регрессии опухолей.

Транскрипционные факторы семейства *MYC* находятся в начале каскада сигнальных событий, приводящих к злокачественному перерождению клетки. Ингибирование экспрессии *MYC*-регулируемых генов, также обладающих трансформирующей активностью, будет в меньшей степени влиять на развитие опухоли, чем ингибирование экспрессии самого *тус* [69].

Постоянная экспрессия *тус* наблюдается только в делящихся клетках, которые составляют меньшую часть клеточной популяции в большинстве органов. Следовательно, побочные эффекты, связанные с анти-*MYC*-терапией, будут проявляться только в зонах с высокой пролиферативной активностью, таких как костный мозг и желудочно-кишечный тракт, что наблюдается и при использовании традиционных химиопрепаратов.

Подавление экспрессии гена *c-тус* снимает запрет репарации двуцепочечных разрывов ДНК и снижает вероятность возникновения транслокаций и других повреждений геномной ДНК [45, 77, 152], которые могут приводить к возникновению устойчивости опухолей к различным терапевтическим препаратам.

Ниже будут рассмотрены как достаточно хорошо разработанные стратегии, так и недавно предложенные экспериментальные подходы, направленные на ингибирование функции *MYC* в различных опухолях.

Блокирование взаимодействий *MYC* с *MAX*.

Одним из подходов, направленных на ингибирование функции *MYC*, является использование вирусных векторов, экспрессирующих потенциальные раковые супрессоры — белки семейства *MAD* и *MXI*, которые в комплексе с *MAX* связываются с последовательностями *E*-бокса и функционируют как антагонисты *MYC/MAX* димеров. Показано, что эндогенная экспрессия *MXI1* [157] или *MAD* [22, 47] с помощью аденовирусных конструкций приводит к снижению скорости пролиферации клеток глиобластомы, астроцитомы или клеток рака печени *in vitro*, а также к

ингибированию образования опухолей в экспериментах на животных *in vivo*. Однако использование такой стратегии в противоопухолевой терапии имеет ряд ограничений, связанных с применением аденовирусных векторов. Во-первых, не все типы клеток экспрессируют достаточное количество вирусных рецепторов, что ограничивает доставку аденовирусных конструкций. Например, уровень трансфекции в клетки карциномы яичников (IGROV) и лимфомы Беркитта (CA46) составил менее 5% [22]. Во-вторых, при использовании аденовирусных векторов в экспериментах на животных наблюдается значительное накопление препаратов в печени и их гепатотоксическое действие [47]. Еще одним ограничением использования аденовирусных конструкций *in vivo* является развитие иммунного ответа и, как следствие, невозможность введения повторных доз препарата из-за сильной сенсibilизации организма [93]. Поэтому безопасное использование таких препаратов возможно лишь при инъекциях непосредственно в опухоль.

Еще одним подходом, направленным на ингибирование онкогенной функции MYC, является использование агентов, вызывающих нарушение образования комплекса MYC/MAX. Развитию данного подхода способствовали детальные исследования структуры MYC/MAX гетеродимеров. Применение методов молекулярного моделирования и мутагенеза позволило выявить участки, ответственные за специфичность димеризации [143]. Были обнаружены четыре аминокислоты, расположенные в LZ-районе MYC и участвующие в димеризации с MAX.

Для ингибирования MYC/MAX димеризации используют мутантные белки, пептиды, а также низкомолекулярные соединения. В работе Nasi и соавт. [144] отмечено, что эндогенная экспрессия мутантного по b-HLH домену белка Omomyc ингибирует образование колоний клетками NIH3T3. Omomyc образует комплексы с MYC, не способные связываться с последовательностью E-бокса. Анализ уровня экспрессии MYC-регулируемых генов показал, что Omomyc приводит к блокированию экспрессии MYC-индуцируемых генов, однако не влияет на экспрессию MYC-ингибируе-

мых генов. Кроме того, Omomyc может селективно запускать апоптоз клеток, характеризующихся гиперэкспрессией *myc*, возможно, по механизму транскрипционной репрессии генов. Микроинъекции трансгенной ДНК, кодирующей Omomyc, мышам с MYC-индуцируемым раком кожи ингибировало образование папиллом, а также восстанавливало нормальную дифференцировку кератиноцитов и архитектуру кожи [145]. Таким образом, Omomyc как бы перепрограммирует функции онкогенного MYC. С терапевтической точки зрения важно, что Omomyc воздействует только на клетки с нарушенной функцией MYC и не оказывает влияния на окружающие нормальные клетки.

Мутантные белки MYC, содержащие только гетеродимеризационный b-HLH-LZ или HLH-LZ домен, специфично ингибируют связывание c-MYC/MAX димеров с ДНК, что приводит к индукции апоптоза в фибробластах мыши 3T3-L1 [82]. Показано, что модифицированный пептид, состоящий из 14 аминокислотных остатков (H1-S6A, F8A), гомологичный участку первой спирали b-HLH-LZ домена c-MYC, также нарушает связывание c-MYC с ДНК [38]. При реализации этих подходов одной из основных является проблема эффективной доставки препаратов в ядра опухолевых клеток *in vivo*. Примером ее решения может служить объединение модифицированного пептида H1-S6A, F8A с 16-звенным пептидом, гомологичным фрагменту третьей спирали гомеодомена Antennapedia (Int) дрозофилы, который содержит сигнал ядерной локализации NLS и эффективно проникает в разные типы клеток млекопитающих [49]. Такой химерный пептид способен эффективно проникать в клетки MCF-7, ингибировать их рост, вызывать апоптоз, а также подавлять экспрессию двух c-MYC-регулируемых генов *odc* (орнитин декарбоксилазы) и *p53*. Химерный пептид Int-H1-S6A, F8A был также исследован *in vivo*.

В экспериментах на мышах выявлено, что он обладает повышенной активностью и стабильностью [108]. Показано, что пептид накапливается в высоких концентрациях в различных органах мышей (в печени, легких, селезенке и почках, но не в мозгу) и эффективно ингибирует

пролиферацию раковых клеток кишечника [108]. Необходимость использования найденного пептида в относительно высоких концентрациях (10—50 мкмоль или 5 мг/кг массы тела животного) ограничивает его применение *in vivo*.

При скрининге комбинаторных химических библиотек были найдены низкомолекулярные ингибиторы, блокирующие образование MYC/MAX димеров. Одной из групп исследователей обнаружены два соединения, которые ингибируют с-MYC- или JUN-индуцированную трансформацию клеток фибробластов куриных эмбрионов. К сожалению, молекулярные механизмы действия таких соединений на образование димеров MYC/MAX пока достоверно не выяснены, однако предполагается, что ингибиторы воздействуют на LZ домены, содержащиеся как в белке MYC, так и в белке JUN [12]. Другая группа исследователей идентифицировала семь ингибиторов, нарушающих взаимодействие b-HLH-LZ доменов с-MYC и MAX [161]. Данные соединения блокируют активацию репортерного гена, находящегося под MYC-регулируемым промотором, и ингибируют рост фибробластов крысы *in vitro*. Инкубирование трансформированных фибробластов с четырьмя из этих соединений в течение 3 дней предотвращает образование опухолей *in vivo* при последующей инъекции клеток мышам линии nude. Кроме того, одно из найденных соединений (10058-F4) ингибирует пролиферацию клеток лимфомы человека [51]. Третьей группой исследователей были обнаружены два низкомолекулярных соединения, способных индуцировать апоптоз клеток, характеризующихся повышенной экспрессией гена с-тус, но не действующих на клетки, мутантные по с-тус [101]. Еще одна группа обнаружила пять соединений, вызывающих более 50% ингибирования N-MYC-зависимой люциферазной активности в клетках нейробластомы [94]. Активность соединений *in vivo* пока не исследована.

Одним из недостатков найденных низкомолекулярных ингибиторов является необходимость использования их в относительно высоких концентрациях (10—100 мкмоль) для достижения значимых биологических эффектов. Тем не менее в перспективе на основе этих соеди-

нений возможно создание новых библиотек для поиска более эффективных низкомолекулярных ингибиторов MYC/MAX-димеризации.

Экспрессия токсинов под контролем MYC-регулируемых промоторов. Другим подходом, направленным на ингибирование пролиферации опухолевых клеток, является создание конструкций, экспрессирующих гены токсинов под контролем MYC-регулируемого промотора. Авторами одной из таких работ был создан вектор, кодирующий тимидинкиназу вируса герпеса (HSV-TK) под контролем четырех tandemных последовательностей E-бокса [84]. Трансфекция разных линий мелкоклеточной карциномы легкого (SCLC), характеризующихся повышенным уровнем экспрессии с-, L- или N-тус генов, исследуемым вектором приводит к повышению чувствительности клеток к ганцикловиру. В экспериментах на мышах наблюдается значительное ингибирование роста опухолей, трансфицированных вектором, после обработки ганцикловиrom. Аналогичный подход был применен другой группой, которая использовала вектор, экспрессирующий карбоксилэстеразу (CE) печени крысы под контролем с- или N-MYC-активируемого промотора орнитиндекарбоксилазы (ODC) [116]. CE, в свою очередь, необходима для активации предшественника лекарственного средства иринотекана. Трансфекция клеточных линий нейробластом таким вектором приводит к повышению чувствительности опухолевых клеток к иринотекану *in vitro* [116] и *in vivo* [154]. Чтобы избежать возникновения неспецифических эффектов, связанных с проникновением вектора в нормальные клетки и ткани, в группе L. Johnson [149] был создан модифицированный аденовирусный вектор, экспрессирующий CE, репликация которого могла осуществляться только в опухолевых клетках, мутантных по p53. Показано *in vivo*, что цитотоксическое действие CE-экспрессирующих вирусных конструкций в комбинации с иринотеканом на опухоли значительно увеличивается по сравнению с действием вектора без CE.

Ингибирование экспрессии MYC

Олигонуклеотиды, их производные и аналоги находят широкое применение в генной терапии благодаря своей универсальной способности связываться с нуклеиновыми кислотами и влиять на их функции в клетках. Такое влияние может осуществляться путем блокирования транскрипции (антигенный подход) или трансляции (антисмысловой подход, РНК-интерференция).

Антигенный подход основан на специфическом блокировании транскрипции генов-мишеней путем нарушения связывания транскрипционных факторов с регуляторными последовательностями генов.

Триплекс-формирующие олигонуклеотиды (ТФО) способны сиквенс-специфически связываться с большой бороздкой дцДНК. Такое связывание обеспечивается образованием хугстеновских взаимодействий между полипуриновым (полипиримидиновым) трактом дцДНК и пури- или пиримидин-богатым ТФО. Образование триплексов нарушает связывание транскрипционных активаторов с промоторным участком ДНК, что приводит к ингибированию инициации или элонгации транскрипции [50]. Одной из основных проблем использования указанного подхода является нестабильность триплексов при физиологических условиях. Для решения этой проблемы используют введение химических модификаций в составе ТФО, таких как 5-метилцитозин, 8-оксоаденин, также используют положительно заряженные тимидиновые аналоги или модификации сахарофосфатного остова, например, 2'-О-(2-аминоэтил) производные рибозы [21]. Тиофосфатные аналоги ТФО применяют для повышения стабильности олигонуклеотидов в биологических средах [97].

Действие ТФО как специфических ингибиторов транскрипции генов семейства *тус* было продемонстрировано на клеточных культурах *in vitro*. Группой C.V. Catapano установлено, что тиофосфатный аналог ТФО способен эффективно ингибировать экспрессию гена *с-тус* в клетках лейкемии и лимфомы, что приводит к снижению скорости пролиферации клеток и к их апоптозу [97]. В более поздних исследованиях эти же авторами доказано, что присоединение к

ТФО ДНК-интеркалирующего агента дауномицина значительно увеличивает стабильность образуемых триплексов, а также повышает эффективность ингибирующего действия ТФО на экспрессию гена *с-тус* в клетках рака предстательной железы или рака груди по сравнению с действием немодифицированного ТФО [19, 105]. Обнаружено, что конъюгат ТФО с дауномицином ингибирует пролиферацию опухолевых клеток, но не оказывает влияния на рост нормальных фибробластов, экспрессирующих низкий уровень *с-тус*, что свидетельствует о селективном действии препарата.

Соединения, стабилизирующие образование G-тетраплексов. Еще одним подходом, направленным на блокирование транскрипции *с-тус*, является использование катионных порфиринов или их производных, способных связываться с ДНК и стабилизировать образование G-тетраплексных структур в районе промотора гена *с-тус*, что приводит к ингибированию транскрипции [137]. Показано, что катионный порфирин TMPyP4 эффективно ингибирует транскрипцию гена *с-тус in vitro*, а также замедляет рост опухолей у крыс *in vivo* [53]. Однако для достижения биологических эффектов необходимо использовать TMPyP4 в достаточно высоких концентрациях (100 мкмоль). В более поздних работах были описаны аналоги порфирина или другие низкомолекулярные соединения, использование которых позволяет значительно повысить селективность связывания с промотором гена *с-тус*, а также увеличить стабильность G-тетраплексов [86, 133], однако их действие на экспрессию гена-мишени и пролиферацию клеток не исследовано.

В работе T. Simonsson и M. Henriksson показано [138], что при инкубировании клеток лимфомы Беркитта с олигонуклеотидом, образующим в физиологических условиях G-тетраплексную структуру, наблюдается ингибирование пролиферации клеток вследствие нарушения связывания транскрипционных факторов с промотором гена *с-тус*.

Антисмысловой подход. Одним из перспективных направлений, разрабатываемых для лечения ряда онкологических заболеваний, яв-

ляется антисмысловой подход, основанный на специфическом связывании олигонуклеотида с РНК-мишенью. Ингибирующее действие антисмысловых олигонуклеотидов (ASO) основано на активности РНК-азы H, которая гидролизует РНК в ДНК/РНК гетеродуплексах в 3'→5' направлении [100]. Действие РНК-азы H практически не зависит от последовательности и даже от введения в состав олигонуклеотида некоторых химических модификаций [91]. Другой возможный механизм действия ASO основан на том, что образование гибридного дуплекса с определенными последовательностями может приводить к нарушению связывания рибосом с мРНК или к нарушению сплайсинга пре-мРНК. Эффективность образования комплекса олигомер — мРНК зависит главным образом от вторичной структуры мРНК, что необходимо учитывать при подборе антисмыслового олигонуклеотида. Одно из первых успешных исследований ингибирования экспрессии гена *c-тус* с помощью антисмысловой технологии было осуществлено более 20 лет назад [59, 159]. С тех пор антисмысловая технология развивается по пути увеличения стабильности ASO и улучшения их доставки в клетки. Использование химически модифицированных олигонуклеотидов, например тиофосфатных, фосфорамидатных, морфолиновых и других производных, позволяет увеличить срок их жизни в клетках [146].

Исследования *in vitro* показали, что подавление экспрессии генов семейства *тус* (*c-тус*, *N-тус*) антисмысловыми олигонуклеотидами или их тиофосфатными аналогами приводит к ингибированию пролиферации клеток лейкемии [62, 92, 124], рака молочной железы [20] или нейробластомы [106], а также к блокированию перехода клеток из G1- в S-фазу клеточного цикла, к индукции апоптоза или дифференцировки. В более поздних работах тиофосфатные аналоги ASO, направленные на ингибирование экспрессии генов *тус*, исследовали на модельных животных с ксенотрансплантатами меланомы [88, 115], лимфомы [64, 140, 141] и нейробластомы [18]. Установлено, что *in vivo* исследуемые ASO ингибируют опухолевый рост, уменьшают число метастазов, а также увеличивают продолжитель-

ность жизни животных. Однако для достижения противоопухолевого эффекта требуется достаточно продолжительное (1–6 нед) введение животным больших доз ASO (15–20 мг/кг массы тела в день). Значительное снижение концентрации, необходимой для достижения биологического эффекта ASO (общая доза составила 10 мг/кг массы тела), было достигнуто при использовании в качестве трансфектанта катионных липидов, способных селективно связываться с GD₂-рецепторами на поверхности клеток меланомы [115].

Интересным является факт, что устойчивость некоторых видов опухолей к цитостатику цисплатину коррелирует с повышенным уровнем экспрессии гена *c-тус* [139]. Так, *in vitro* анти-*c-тус* ASO в комбинации с цисплатином более эффективно ингибируют пролиферацию клеток рака мочевого пузыря [100] или карциномы легких [153], чем каждый препарат по отдельности. В более поздних работах проведены исследования на мышах, которым были трансплантированы клетки меланомы. Тиофосфатный аналог ASO увеличивает эффективность действия цисплатина на клетки меланомы *in vitro* и *in vivo* [25], что приводит к ингибированию роста опухолей, уменьшению числа метастазов и увеличению продолжительности жизни животных. С. Leonetti и соавт. показали [87], что внутривенное введение мышам тиофосфатного аналога ASO INX-6295, инкапсулированного в липидные частицы, приводит к ингибированию опухолевого роста меланомы. При введении олигонуклеотида вместе с цисплатином у 30% подопытных животных наблюдалась полная регрессия опухолей. Кроме того, комбинированное применение анти-*bcl-2* ASO, цисплатина и INX-6295 на мышах с ксенотрансплантатами меланомы человека, характеризующейся повышенной экспрессией онкогенов *bcl-2* или *c-тус*, приводит к задержке или полному блокированию опухолевого роста, увеличению степени апоптоза, а также ингибированию ангиогенеза [164].

Одними из многообещающих олигонуклеотидных аналогов являются морфолиновые производные (PMO) — незаряженные молекулы, в ко-

торых сахарофосфатный остов заменен на морфолиновые кольца, соединенные фосфодиамидными связями. РМО характеризуются повышенной устойчивостью к нуклеазам, достаточно эффективно проникают в клетки, а также образуют с РНК-дуплексы, обладающие повышенной стабильностью. В экспериментах на мышах показано, что ингибирование *myc* с помощью морфолинового аналога ASO AVI-4126 приводит к преодолению устойчивости к цисплатину клеток карциномы легких [81]. Потенцирование противоопухолевой активности AVI-4126 было также показано при использовании его в комбинации с ASO, направленным на ингибирование ростового фактора — человеческого хориального гонадотропина, в клетках рака предстательной железы [36]. Кроме того, эксперименты *in vivo* показали, что AVI-4126 эффективно ингибирует клеточную пролиферацию при поликистозах почек [128], регенерации печени [7] и при сосудистых рестенозах, развивающихся после оперативных вмешательств [80]. Первая фаза клинических испытаний показала, что внутривенное введение AVI-4126 не вызывает цитотоксических эффектов [35, 69] и таких побочных эффектов, как увеличение уровня АПТТ и С3а, анемии, гипотонии и снижения уровня тромбоцитов, часто наблюдаемых при использовании тиофосфатных аналогов ASO на уровне организма [60, 70, 89].

Другими перспективными агентами являются пептидные аналоги нуклеиновых кислот (PNA). PNA — это синтетические аналоги дезоксирибоолигонуклеотидов, в которых сахарофосфатный остов заменен полиамид-(2-аминоэтил) глициновым скелетом. Благодаря этому PNA обладают нуклеазоустойчивостью и способностью специфично гибридизоваться с комплементарными последовательностями ДНК или РНК, что позволяет ингибировать транскрипцию и трансляцию [122]. Ингибирование экспрессии гена *N-myc* в клетках нейробластом с помощью PNA-аналогов ASO было исследовано в двух недавних работах [119, 150]. L. Sun и соавт. [150] использовали конъюгаты анти-*N-myc* PNA с аналогом соматостатина, который обеспечивает проникновение конъюгатов в опухолевые клетки, характеризующиеся повышенной экспрессией рецепторов к со-

матостатину. Такие конъюгаты эффективно ингибируют экспрессию гена *N-myc* и клеточную пролиферацию *in vitro*, тогда как PNA без соматостатина не оказывают подобного действия при использовании в тех же концентрациях. В исследовании A. Pession и соавт. показано, что анти-*N-myc* PNA способны проникать в клетки некоторых типов нейробластом без использования каких-либо трансфектантов и ингибировать экспрессию гена *N-myc*, вызывать накопление клеток в G1-фазе клеточного цикла, а также индуцировать дифференцировку и апоптоз [119].

Таким образом, антисмысловой подход широко использовали для ингибирования экспрессии генов семейства *myc* на экспериментальных моделях различных опухолей. Некоторые из анти-*c-myc* препаратов уже успешно прошли первую стадию клинических испытаний и показали свою биобезопасность [35, 69]. Ингибирование экспрессии *N-myc* антисмысловыми олигонуклеотидами исследовали менее подробно, однако существует несколько работ, в которых описаны эксперименты не только на клеточных культурах, но и на модельных животных [118, 158].

Рибозимы. Рибозимы представляют собой олигорибонуклеотиды, обладающие выраженной вторичной структурой и каталитической функцией, их действие основано на специфическом связывании с мРНК-мишенью и последующем ее расщеплении.

Эксперименты на клетках гепатомы показали, что эндогенная экспрессия рибозима с вирусного вектора приводит к эффективному ингибированию экспрессии гена *c-myc*, а также к снижению скорости клеточной пролиферации и к индукции апоптоза [24], однако дальнейшие исследования *in vivo* не проводились.

РНК-интерференция — это современный перспективный подход, направленный на специфическое ингибирование экспрессии генов-мишеней. В экспериментах на нематоде *Caenorhabditis elegans* обнаружено, что при введении в клетки длинной двуцепочечной РНК, гомологичной участку определенного гена, наблюдается специфическая деградация его мРНК [46]. Процесс РНК-интерференции свой-

ственен клеткам всех многоклеточных организмов [99] и является природным механизмом клеточной защиты от вирусной инфекции, активности транспозонов и ретротранспозонов. Установлено, что в эукариотических клетках присутствуют гены, кодирующие особый тип не-транслируемых РНК (микро-РНК), которые играют важную роль в регуляции генной экспрессии и онтогенеза [98]. Механизмы созревания и ингибирующего действия микро-РНК во многом сходны с процессом РНК-интерференции.

При попадании дцРНК в клетку происходит ее ферментативное фрагментирование с образованием дуплексов длиной 21–25 п.н. с выступающими 2–3 нуклеотидами на 3'-концах [98, 162], которые в составе белкового комплекса RISC (RNA-induced silencing complex, РНК-зависимый ингибирующий комплекс) связываются с комплементарной им РНК-мишенью и вызывают ее направленную деградацию [57].

РНК-интерференция рассматривается как перспективный инструмент для специфической деградации вирусных или онкогенных мРНК в противовирусной и противоопухолевой терапии [102, 112].

Отсутствие компонентов интерфероновой системы у беспозвоночных позволяет применять длинные дцРНК для подавления генной экспрессии по механизму РНК-интерференции, однако использование длинной дцРНК в клетках млекопитающих ограничено из-за развития неспецифического интерферонового ответа [110]. В клетках млекопитающих механизм специфической деградации РНК может быть запущен, если использовать не протяженные дцРНК, а короткие синтетические дуплексы, имитирующие фрагменты РНК, получающиеся в ходе ее фрагментации ферментом Дайсер — siРНК [42].

Поскольку РНК-интерференция является повсеместно распространенным эндогенным клеточным механизмом, эффективность ингибирования, достигаемая при использовании siРНК, существенно выше эффективности действия антисмысловых олигонуклеотидов или рибозимов [39]. Так, например, непосредственное сравнение показало, что siРНК в 100–1000 раз более эффективно ингибирует экспрессию гена-

мишени, чем антисмысловый олигонуклеотид [14]. Высокая эффективность ингибирования с помощью РНК-интерференции может быть связана с каталитической природой этого процесса, где одна молекула siРНК может вызывать расщепление многих молекул мРНК [68]. Еще одной причиной высокой эффективности РНК-интерференции, вероятно, является защита антисмысловой цепи siРНК от эндогенных РНК-аз комплексом RISC.

Ингибирование экспрессии генов семейства *tus* с помощью интерферирующих РНК. Подавление экспрессии гена *c-tus* в клетках карциномы легкого человека A549, гепатомы HepG2 и аденокарциномы молочной железы MCF-7 было достигнуто с помощью векторов, экспрессирующих siРНК или shРНК (short hairpin RNA, короткая шпильчатая РНК) [63, 155]. Показано, что под действием аденовирусного вектора, экспрессирующего siРНК, направленную к последовательности в 3-м экзоне мРНК гена *c-tus*, в клетках A549 и HepG2 существенно снижается уровень белка *c-myc* [63]. В результате другого исследования выявлено, что трансфекция в клетки MCF-7 с помощью липофектамина плазмиды, экспрессирующей shРНК, направленную к 3'-нетранслируемому району мРНК гена *c-tus*, также снижет уровень экспрессии белка и ингибирует рост раковых клеток *in vitro* и *in vivo* [155]. Использование плазмидных или вирусных векторов для экспрессии интерферирующих РНК *in vivo* связано с опасностью неконтролируемого встраивания фрагментов ДНК в геном [148], поэтому из соображений биобезопасности использование siРНК для подавления экспрессии терапевтически значимых генов является предпочтительным.

Успешное подавление экспрессии генов *c-tus* и *N-tus* с помощью siРНК в клетках человека GT38, HeLa, MCF-7, KB-3-1, SK-N-MC и IMR-32 было продемонстрировано несколькими группами исследователей [33, 48, 74–76, 136]. Подавление экспрессии гена *c-tus* с помощью siРНК, направленной к 3'-нетранслируемому району мРНК этого гена в клетках GT38, инфицированных вирусом Эпштейна–Барра (EBV), не влияет на пролиферацию этих

клеток, однако блокирует реактивацию вируса, индуцированную форболовым эфиром [48].

Эффективное и специфичное ингибирование экспрессии генов *c-myc* и *N-myc*, а также пролиферации клеток карциномы KB-3-1 и нейробластом SK-N-MC, IMR-32 было достигнуто с помощью siРНК, одна из которых — siEx3 направлена к участку 3-го экзона *c-myc* мРНК, а другая — siEx2 — к гомологичным районам 2-х экзонов генов *c-* и *N-myc* [74–76]. Выбор последовательности siРНК siEx2 в высококонсервативных участках мРНК генов *myc* обусловлен следующими преимуществами: возможность использования этой siРНК для ингибирования экспрессии генов *c-* и *N-myc* одновременно, что особенно важно для нейробластом (например, клетки IMR-32), где зачастую подавление экспрессии одного из генов семейства *myc* (*c-myc* или *N-myc*) приводит к активации другого [18]; использование siEx2 для ингибирования генов-мишеней в клетках млекопитающих разных видов. Сравнение последовательностей мРНК генов *c-myc* мыши, крысы, собаки, кролика и человека показало, что для участка, соответствующего по последовательности siEx2, наблюдается 100%-я консервативность, что позволяет использовать siEx2 в экспериментах на животных-моделях с целью оценки потенциала siРНК как противоопухолевых лекарственных препаратов.

L. Shen и соавт. использовали поли-2'-O-(2,4-динитрофенил)-модифицированную 21-звенную антисмысловую РНК (поли-ДНФ-РНК) [136], комплементарную району AUG-кодона мРНК гена *c-myc*, для подавления экспрессии последнего *in vitro* и *in vivo*. Поли-ДНФ-РНК-аналог был использован для увеличения нуклеазоустойчивости РНК и облегчения ее захвата клетками [23]. Известно, что антисмысловые однопочечные РНК могут действовать по механизму РНК-интерференции в том случае, когда химические модификации такой РНК обеспечивают ее устойчивость к действию рибонуклеаз [6]. Экспериментальные данные, полученные *in vitro*, показали, что трансфекция клеток MCF-7 с помощью олигофектамина 100 нмоль поли-ДНФ-РНК не только снижает уровень мРНК и белка *c-myc*, но и ин-

гибирует рост раковых клеток. Результаты, полученные *in vivo*, подтверждают эффективность действия ДНФ-модифицированных РНК как ингибиторов опухолевого роста, тогда как немодифицированные siРНК без использования специальных средств направленной доставки в клетки оказались в этой системе не активны.

Несмотря на очевидные преимущества в эффективности действия, применение siРНК *in vivo* имеет такие же ограничения, как и применение антисмысловой технологии, а именно стабильность siРНК во внеклеточных жидкостях и ее доставка внутрь клеток. Увеличение стабильности siРНК достигается введением различных химических модификаций по всей длине молекулы или в нуклеазочувствительных участках [2, 17]. Наиболее актуальной проблемой остается направленная доставка siРНК внутрь клеток. Одним из возможных путей ее решения является ковалентное или нековалентное присоединение к siРНК антител или лигандов, способных связываться с рецепторами на поверхности клеток. Направленная доставка siРНК в определенные типы клеток приведет не только к снижению концентраций siРНК, необходимых для эффективного ингибирования генной экспрессии, но и ограничит возможные токсические эффекты, связанные с действием siРНК на другие клетки и ткани организма. Проблему направленной доставки siРНК в опухолевые клетки *in vivo* попытались решить в группе Lieberman [162] путем использования нескольких siРНК, направленных на ингибирование экспрессии генов *c-myc*, *hdm2* и *VEGF*, в составе нековалентного комплекса с химерным белком, состоящим из положительно заряженного белка протамина и специфического антитела. Установлено, что такой препарат *in vivo* эффективно ингибирует пролиферацию клеток меланомы, эктопически экспрессирующих лиганд для используемого антитела [142]. Использование антител для доставки в определенные типы клеток позволяет снизить концентрацию siРНК в 15 раз по сравнению с использованием в качестве транспортера молекулы холестерина [90]. Этот новый подход позволяет создать летальную смесь siРНК, действующих через *myc*-индуцируемые клеточные

рецепторы, для направленного ингибирования прогрессии опухолей.

Таким образом, РНК-интерференция является наиболее перспективным из известных сегодня методов регуляции экспрессии терапевтически значимых генов. В последнее время интерферирующие РНК широко применяются для подавления экспрессии генов млекопитающих, в молекулярно-биологических и биомедицинских исследованиях. Несколько препаратов siРНК уже находятся на второй стадии клинических испытаний, например, siРНК, направленная на ингибирование ангиогенного ростового фактора (VEGF), а также siРНК, предназначенная для лечения возрастной дистрофии сетчатки глаза [113]. Предварительные результаты исследований в небольшой группе людей свидетельствуют о том, что siРНК не вызывают токсических эффектов или дальнейшей прогрессии болезни. Следовательно, использование siРНК рассматривается как эффективный и многообещающий подход в противоопухолевой терапии. Несмотря на большой прогресс в понимании механизмов действия двуцепочечных РНК на клетку, для перехода их из категории эффективного инструмента биомедицинских исследований в категорию лекарственных препаратов целый спектр вопросов требует решения. К ним относятся вопросы обеспечения направленной и эффективной доставки в органы и ткани организма, предотвращения неспецифических эффектов и безопасного дозирования препарата для исключения нежелательного снижения уровня экспрессии гена-мишени в здоровых тканях.

Литература

1. Adachi S., Obaya A.J., Han Z., et al. c-Myc is necessary for DNA damage-induced apoptosis in the G(2) phase of the cell cycle // Mol. Cell Biol. 2001. V. 21. P. 4929–4937.
2. Amarzguioui M., Holen T., Babaie E., Prydz H. Tolerance for mutations and chemical modifications in a siRNA // Nucleic Acids Res. 2003. V. 31. P. 589–595.
3. Amati B., Dalton S., Brooks M.W., et al. Transcriptional activation by the human c-Myc oncoprotein in yeast requires interaction with Max // Nature. 1992. V. 359. P. 423–426.
4. Arabi A., Wu S., Ridderstrale K., et al. c-Myc associates with ribosomal DNA and activates RNA polymerase I transcription // Nat. Cell Biol. 2005. V. 7. P. 303–310.
5. Arnold I., Watt F.M. c-MYC activation in transgenic mouse epi-

- dermis results in mobilization of stem cells and differentiation of their progeny // Curr. Biol. 2001. V. 11. P. 558–568.
6. Aronin N. Target selectivity in mRNA silencing // Gene Ther. 2006. V. 13. P. 509–516.
7. Arora V., Knapp D.C., Smith B.L., et al. c-Myc antisense limits rat liver regeneration and indicates role for c-Myc in regulating cytochrome P-450 3A activity // J. Pharmacol. Exp. Ther. 2000. V. 292. P. 921–928.
8. Asai A., Miyagi Y., Sugiyama A., et al. The s-MYC protein having the ability to induce apoptosis is selectively expressed in rat embryo chondrocytes // Oncogene. 1994. V. 9. P. 2345–2352.
9. Ayer D.E., Kretzner L., Eisenman R.N. Mad: a heterodimeric partner for Max that antagonizes Myc transcriptional activity // Cell. 1993. V. 72. P. 211–222.
10. Barsyte-Lovejoy D., Mao D.Y., Penn L.Z. c-Myc represses the proximal promoters of GADD45a and GADD153 by a post-RNA polymerase II recruitment mechanism // Oncogene. 2004. V. 23. P. 3481–3486.
11. Baxevas A.D., Vinson C.R. Interactions of coiled coils in transcription factors: where is the specificity? // Curr. Opin. Genet. Dev. 1993. V. 3. P. 278–285.
12. Berg T., Cohen S.B., Desharnais J., et al. Small-molecule antagonists of Myc/Max dimerization inhibit Myc-induced transformation of chicken embryo fibroblasts // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2002. V. 99. P. 3830–3835.
13. Bernasconi N.L., Wormhoudt T.A., Laird-Of-fringa I.A. Post-transcriptional deregulation of myc genes in lung cancer cell lines // Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 2000. V. 23. P. 560–565.
14. Bertrand J.R., Pottier M., Vekris A., et al. Comparison of antisense oligonucleotides and siRNAs in cell culture and *in vivo* // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2002. V. 296. P. 1000–1004.
15. Blackwell T.K., Kretzner L., Blackwood E.M., et al. Sequence-specific DNA binding by the c-Myc protein // Science. 1990. V. 250. P. 1149–1151.
16. Boxer L.M., Dang C.V. Translocations involving c-Myc and c-Myc function // Oncogene. 2001. V. 20. P. 5595–5610.
17. Braasch D.A., Jensen S., Liu Y., et al. RNA interference in mammalian cells by chemically-modified RNA // Biochemistry. 2003. V. 42. P. 7967–7975.
18. Burkhardt C.A., Cheng A.J., Madafoglio J., et al. Effects of MYCN antisense oligonucleotide administration on tumorigenesis in a murine model of neuroblastoma // J. Natl. Cancer Inst. 2003. V. 95. P. 1394–1403.
19. Carbone G.M., McGuffie E., Napoli S., et al. DNA binding and antigenic activity of a daunomycin-conjugated triplex-forming oligonucleotide targeting the P2 promoter of the human c-Myc gene // Nucleic Acids Res. 2004. V. 32. P. 2396–2410.
20. Carroll J.S., Swarbrick A., Musgrove E.A., Sutherland R.L. Mechanisms of growth arrest by c-myc antisense oligonucleotides in MCF-7 breast cancer cells: implications for the antiproliferative effects of antiestrogens // Cancer Res. 2002. V. 62. P. 3126–3131.
21. Casey B.P., Glazer P.M. Gene targeting via triple-helix formation // Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 2001. V. 67. P. 163–192.
22. Chen J., Willingham T., Margraf L.R., et al. Effects of the myc oncogene antagonist, MAD, on proliferation, cell cycling and the malignant phenotype of human brain tumour cells // Nat. Med. 1995. V. 1. P. 638–643.
23. Chen X., Shen L., Wang J.H. Poly-2'-DNP-RNAs with enhanced

- efficacy for inhibiting cancer cell growth // *Oligonucleotides*. 2004. V. 14. P. 90—99.
24. **Cheng J., Luo J., Zhang X., et al.** Inhibition of cell proliferation in HCC-9204 hepatoma cells by a *C-myc* specific ribozyme // *Cancer Gene Ther.* 2000. V. 7. P. 407—412.
25. **Citro G., D'Agnano I., Leonetti C., et al.** *c-Myc* antisense oligodeoxynucleotides enhance the efficacy of cisplatin in melanoma chemotherapy *in vitro* and in nude mice // *Cancer Res.* 1998. V. 58. P. 283—289.
26. **Cole M.D., Cowling V.H.** Transcription-independent functions of MYC: regulation of translation and DNA replication // *Nat. Rev. Mol. Cell Biol.* 2008. V. 9. P. 810—815.
27. **Collins V.P.** Amplified genes in human gliomas // *Semin. Cancer Biol.* 1993. V. 4. P. 27—32.
28. **Cowling V.H., Cole M.D.** Mechanism of transcriptional activation by the Myc oncoproteins // *Semin. Cancer Biol.* 2006. V. 16. P. 242—252.
29. **Cowling V.H., Cole M.D.** The Myc transactivation domain promotes global phosphorylation of the RNA polymerase II carboxy-terminal domain independently of direct DNA binding // *Mol. Cell Biol.* 2007. V. 27. P. 2059—2073.
30. **Dang C.V.** *c-Myc* target genes involved in cell growth, apoptosis, and metabolism // *Mol. Cell Biol.* 1999. V. 19. P. 1—11.
31. **Dani C., Blanchard J.M., Piechaczyk M., et al.** Extreme instability of Myc mRNA in normal and transformed human cells // *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 1984. V. 81. P. 7046—7050.
32. **D'Cruz C.M., Gunther E.J., Boxer R.B., et al.** *c-MYC* induces mammary tumorigenesis by means of a preferred pathway involving spontaneous Kras2 mutations // *Nat. Med.* 2001. V. 7. P. 235—239.
33. **Demeterco C., Itkin-Ansari P., Tyrberg B., et al.** *c-Myc* controls proliferation versus differentiation in human pancreatic endocrine cells // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* 2002. V. 87. P. 3475—3485.
34. **DePinho R.A., Schreiber-Agus N., Alt F.W.** *myc* family oncogenes in the development of normal and neoplastic cells // *Adv. Cancer Res.* 1991. V. 57. P. 1—46.
35. **Devi G.R., Beer T.M., Corless C.L., et al.** *In vivo* bioavailability and pharmacokinetics of a *c-MYC* antisense phosphorodiamidate morpholino oligomer, AVI-4126, in solid tumors // *Clin. Cancer Res.* 2005. V. 11. P. 3930—3938.
36. **Devi G.R., Oldenkamp J.R., London C.A., Iversen P.L.** Inhibition of human chorionic gonadotropin beta-subunit modulates the mitogenic effect of *c-myc* in human prostate cancer cells // *Prostate.* 2002. V. 53. P. 200—210.
37. **Dominguez-Sola D., Ying C.Y., Grandori C., et al.** Non-transcriptional control of DNA replication by *c-Myc* // *Nature.* 2007. V. 448. P. 445—451.
38. **Draeger L.J., Mullen G.P.** Interaction of the bHLH-zip domain of *c-Myc* with H1-type peptides. Characterization of helicity in the H1 peptides by NMR // *J. Biol. Chem.* 1994. V. 269. P. 1785—1793.
39. **Dykxhoorn D.M., Lieberman J.** The silent revolution: RNA interference as basic biology, research tool, and therapeutic // *Annu. Rev. Med.* 2005. V. 56. P. 401—423.
40. **Eberhardy S.R., Farnham P.J.** *c-Myc* mediates activation of the cad promoter via a post-RNA polymerase II recruitment mechanism // *J. Biol. Chem.* 2001. V. 276. P. 48562—48571.
41. **Eder P.S., DeVine R.J., Dagle J.M., Walder J.A.** Substrate specificity and kinetics of degradation of antisense oligonucleotides by a 3' exonuclease in plasma // *Antisense Res. Dev.* 1991. V. 1. P. 141—151.
42. **Elbashir S.M., Harborth J., Lendeckel W., et al.** Duplexes of 21-nucleotide RNAs mediate RNA interference in cultured mammalian cells // *Nature.* 2001. V. 411. P. 494—498.
43. **Emens L.A.** Trastuzumab: targeted therapy for the management of HER-2/neu-overexpressing metastatic breast cancer // *Am. J. Ther.* 2005. V. 12. P. 243—253.
44. **Felsher D.W., Bishop J.M.** Reversible tumorigenesis by MYC in hematopoietic lineages // *Mol. Cell.* 1999. V. 4. P. 199—207.
45. **Fest T., Mougey V., Dalstein V., et al.** *c-MYC* overexpression in Ba/F3 cells simultaneously elicits genomic instability and apoptosis // *Oncogene.* 2002. V. 21. P. 2981—2990.
46. **Fire A., Xu S., Montgomery M.K., et al.** Potent and specific genetic interference by double-stranded RNA in *Caenorhabditis elegans* // *Nature.* 1998. V. 391. P. 806—811.
47. **Gagandeep S., Ott M., Nisen P.D., et al.** Overexpression of Mad transcription factor inhibits proliferation of cultured human hepatocellular carcinoma cells along with tumor formation in immunodeficient animals // *J. Gene Med.* 2000. V. 2. P. 117—127.
48. **Gao X., Wang H., Sairenji T.** Inhibition of Epstein-Barr virus (EBV) reactivation by short interfering RNAs targeting *p38* mitogen-activated protein kinase or *c-myc* in EBV-positive epithelial cells // *J. Virol.* 2004. V. 78. P. 11798—11806.
49. **Giorello L., Clerico L., Pescarolo M.P., et al.** Inhibition of cancer cell growth and *c-Myc* transcriptional activity by a *c-Myc* helix 1-type peptide fused to an internalization sequence // *Cancer Res.* 1998. V. 58. P. 3654—3659.
50. **Giovannangeli C., Helene C.** Triplex-forming molecules for modulation of DNA information processing // *Curr. Opin. Mol. Ther.* 2000. V. 2. P. 288—296.
51. **Gomez-Curet I., Perkins R.S., Bennett R., et al.** *c-Myc* inhibition negatively impacts lymphoma growth // *J. Pediatr. Surg.* 2006. V. 41. P. 207—211.
52. **Gomez-Roman N., Grandori C., Eisenman R.N., White R.J.** Direct activation of RNA polymerase III transcription by *c-Myc* // *Nature.* 2003. V. 421. P. 290—294.
53. **Grand C.L., Han H., Munoz R.M., et al.** The cationic porphyrin TMPyP4 down-regulates *c-MYC* and human telomerase reverse transcriptase expression and inhibits tumor growth *in vivo* // *Mol. Cancer Ther.* 2002. V. 1. P. 565—573.
54. **Grand C.L., Powell T.J., Nagle R.B., et al.** Mutations in the G-quadruplex silencer element and their relationship to *c-MYC* overexpression, NM23 repression, and therapeutic rescue // *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 2004. V. 101. P. 6140—6145.
55. **Gu W., Cechova K., Tassi V., la-Favera R.** Opposite regulation of gene transcription and cell proliferation by *c-Myc* and Max // *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 1993. V. 90. P. 2935—2939.
56. **Habib T., Park H., Tsang M., et al.** Myc stimulates B lymphocyte differentiation and amplifies calcium signaling // *J. Cell Biol.* 2007. V. 179. P. 717—731.
57. **Hammond S.M.** Dicing and slicing: the core machinery of the RNA interference pathway // *FEBS Lett.* 2005. V. 579. P. 5822—5829.
58. **Hann S.R., Eisenman R.N.** Proteins encoded by the human *C-myc* oncogene: differential expression in neoplastic cells // *Mol. Cell Biol.* 1984. V. 4. P. 2486—2497.
59. **Heikkila R., Schwab G., Wickstrom E., et al.** A *c-Myc* antisense oligodeoxynucleotide inhibits entry into S phase but not progress from G0 to G1 // *Nature.* 1987. V. 328. P. 445—449.
60. **Henry S.P., Novotny W., Leeds J., et al.** Inhibition of coagulation by a phosphorothioate oligonucleotide // *Antisense Nucleic Acid Drug Dev.* 1997. V. 7. P. 503—510.
61. **Hoffman B., Amanullah A., Shafarenko M., Liebermann D.A.** The protooncogene *C-myc* in hematopoietic development

- and leukemogenesis // *Oncogene*. 2002. V. 21. P. 3414–3421.
62. **Holt J.T., Redner R.L., Nienhuis A.W.** An oligomer complementary to c-Myc mRNA inhibits proliferation of HL-60 promyelocytic cells and induces differentiation // *Mol. Cell Biol.* 1988. V. 8. P. 963–973.
63. **Hosono T., Mizuguchi H., Katayama K., et al.** Adenovirus vector-mediated doxycycline-inducible RNA interference // *Hum. Gene Ther.* 2004. V. 15. P. 813–819.
64. **Huang Y., Snyder R., Kligshiteyn M., Wickstrom E.** Prevention of tumor formation in a mouse model of Burkitt's lymphoma by 6 weeks of treatment with anti-C-myc DNA phosphorothioate // *Mol. Med.* 1995. V. 1. P. 647–658.
65. **Hui A.B., Lo K.W., Yin X.L., et al.** Detection of multiple gene amplifications in glioblastoma multiforme using array-based comparative genomic hybridization // *Lab. Invest.* 2001. V. 81. P. 717–723.
66. **Hurlin P.J., Queva C., Eisenman R.N.** Mnt, a novel Max-interacting protein is coexpressed with Myc in proliferating cells and mediates repression at Myc binding sites // *Genes Dev.* 1997. V. 11. P. 44–58.
67. **Hurlin P.J., Queva C., Koskinen P.J., et al.** Mad3 and Mad4: novel Max-interacting transcriptional repressors that suppress c-Myc dependent transformation and are expressed during neural and epidermal differentiation // *EMBO J.* 1996. V. 15. P. 2030.
68. **Hutvagner G., Zamore P.D.** A microRNA in a multiple-turnover RNAi enzyme complex // *Science*. 2002. V. 297. P. 2056–2060.
69. **Iversen P.L., Arora V., Acker A.J., et al.** Efficacy of antisense morpholino oligomer targeted to c-myc in prostate cancer xenograft murine model and a Phase I safety study in humans // *Clin. Cancer Res.* 2003. V. 9. P. 2510–2519.
70. **Iversen P.L., Cornish K.G., Iversen L.J., et al.** Bolus intravenous injection of phosphorothioate oligonucleotides causes hypotension by acting as alpha(1)-adrenergic receptor antagonists // *Toxicol. Appl. Pharmacol.* 1999. V. 160. P. 289–296.
71. **Jain M., Arvanitis C., Chu K., et al.** Sustained loss of a neoplastic phenotype by brief inactivation of MYC // *Science*. 2002. V. 297. P. 102–104.
72. **Jonkers J., Berns A.** Oncogene addiction: sometimes a temporary slavery // *Cancer Cell*. 2004. V. 6. P. 535–538.
73. **Junttila M.R., Westermarck J.** Mechanisms of MYC stabilization in human malignancies // *Cell Cycle*. 2008. V. 7. P. 592–596.
74. **Kabilova T.O., Chernolovskaya E.L., Vladimirova A.V., Vlassov V.V.** Inhibition of human carcinoma and neuroblastoma cell proliferation by anti-C-myc siRNA // *Oligonucleotides*. 2006. V. 16. P. 15–25.
75. **Kabilova T.O., Vladimirova A.V., Chernolovskaya E.L., Vlassov V.V.** Arrest of cancer cell proliferation by dsRNAs // *Ann. N.Y. Acad. Sci.* 2006. V. 1091. P. 425–436.
76. **Kabilova T.O., Vladimirova A.V., Repkova M.N., et al.** Silencing of C-myc gene expression by enzymatically and chemically synthesized siRNAs // *Mol. Biol. (Mosk)*. 2006. V. 40. P. 1037–1046.
77. **Karlsson A., Deb-Basu D., Cherry A., et al.** Defective double-strand DNA break repair and chromosomal translocations by MYC overexpression // *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 2003. V. 100. P. 9974–9979.
78. **Kato G.J., Barrett J., Villa-Garcia M., Dang C.V.** An amino-terminal c-Myc domain required for neoplastic transformation activates transcription // *Mol. Cell Biol.* 1990. V. 10. P. 5914–5920.
79. **Kaye F., Battey J., Nau M., et al.** Structure and expression of the human L-myc gene reveal a complex pattern of alternative mRNA processing // *Mol. Cell Biol.* 1988. V. 8. P. 186–195.
80. **Kipshidze N., Keane E., Stein D., et al.** Local delivery of C-myc neutrally charged antisense oligonucleotides with transport catheter inhibits myointimal hyperplasia and positively affects vascular remodeling in the rabbit balloon injury model // *Catheter. Cardiovasc. Interv.* 2001. V. 54. P. 247–256.
81. **Knapp D.C., Mata J.E., Reddy M.T., et al.** Resistance to chemotherapeutic drugs overcome by c-Myc inhibition in a Lewis lung carcinoma murine model // *Anticancer Drugs*. 2003. V. 14. P. 39–47.
82. **Kohlhuber F., Hermeking H., Graessmann A., Eick D.** Induction of apoptosis by the c-Myc helix-loop-helix/leucine zipper domain in mouse 3T3-L1 fibroblasts // *J. Biol. Chem.* 1995. V. 270. P. 28797–28805.
83. **Krause D.S., Van Etten R.A.** Tyrosine kinases as targets for cancer therapy // *N. Engl. J. Med.* 2005. V. 353. P. 172–187.
84. **Kumagai T., Tanio Y., Osaki T., et al.** Eradication of Myc-overexpressing small cell lung cancer cells transfected with herpes simplex virus thymidine kinase gene containing Myc-Max response elements // *Cancer Res.* 1996. V. 56. P. 354–358.
85. **Lee W.H., Murphree A.L., Benedict W.F.** Expression and amplification of the N-myc gene in primary retinoblastoma // *Nature*. 1984. V. 309. P. 458–460.
86. **Lemarteleur T., Gomez D., Paterski R., et al.** Stabilization of the C-myc gene promoter quadruplex by specific ligands' inhibitors of telomerase // *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 2004. V. 323. P. 802–808.
87. **Leonetti C., Biroccio A., Benassi B., et al.** Encapsulation of c-myc antisense oligodeoxynucleotides in lipid particles improves antitumoral efficacy *in vivo* in a human melanoma line // *Cancer Gene Ther.* 2001. V. 8. P. 459–468.
88. **Leonetti C., D'Agnano I., Lozupone F., et al.** Antitumor effect of C-myc antisense phosphorothioate oligodeoxynucleotides on human melanoma cells *in vitro* and in mice // *J. Natl. Cancer Inst.* 1996. V. 88. P. 419–429.
89. **Levin A.A.** A review of the issues in the pharmacokinetics and toxicology of phosphorothioate antisense oligonucleotides // *Biochim. Biophys. Acta*. 1999. V. 1489. P. 69–84.
90. **Li X., Stuckert P., Bosch I., et al.** Single-chain antibody-mediated gene delivery into ErbB2-positive human breast cancer cells // *Cancer Gene Ther.* 2001. V. 8. P. 555–565.
91. **Lima W.F., Mohan V., Crooke S.T.** The influence of antisense oligonucleotide-induced RNA structure on Escherichia coli RNase H1 activity // *J. Biol. Chem.* 1997. V. 272. P. 18191–18199.
92. **Loke S.L., Stein C., Zhang X., et al.** Delivery of c-myc antisense phosphorothioate oligodeoxynucleotides to hematopoietic cells in culture by liposome fusion: specific reduction in c-Myc protein expression correlates with inhibition of cell growth and DNA synthesis // *Curr. Top. Microbiol. Immunol.* 1988. V. 141. P. 282–289.
93. **Lowenstein P.R., Mandel R.J., Xiong W.D., et al.** Immune responses to adenovirus and adeno-associated vectors used for gene therapy of brain diseases: the role of immunological synapses in understanding the cell biology of neuroimmune interactions // *Curr. Gene Ther.* 2007. V. 7. P. 347–360.
94. **Lu X., Pearson A., Lunec J.** The MYCN oncoprotein as a drug development target // *Cancer Lett.* 2003. V. 197. P. 125–130.
95. **Luscher B.** Function and regulation of the transcription factors of the Myc/Max/Mad network // *Gene*. 2001. V. 277. P. 1–14.
96. **Mai S., Mushinski J.F.** c-Myc-induced genomic instability // *J. Environ. Pathol. Toxicol. Oncol.* 2003. V. 22. P. 179–199.
97. **McGuffie E.M., Pachec D., Carbone G.M., Catapano C.V.** Antigenic and antiproliferative effects of a c-Myc-targeting phosphorothioate triple helix-forming oligonucleotide in human leukemia cells // *Cancer Res.* 2000. V. 60. P. 3790–3799.
98. **Meister G., Tuschl T.** Mechanisms of gene silencing by double-

- stranded RNA // *Nature*. 2004. V. 431. P. 343–349.
99. **Mello C.C., Conte D.** Revealing the world of RNA interference // *Nature*. 2004. V. 431. P. 338–342.
100. **Mizutani Y., Fukumoto M., Bonavida B., Yoshida O.** Enhancement of sensitivity of urinary bladder tumor cells to cisplatin by *C-myc* antisense oligonucleotide // *Cancer*. 1994. V. 74. P. 2546–2554.
101. **Mo H., Henriksson M.** Identification of small molecules that induce apoptosis in a Myc-dependent manner and inhibit Myc-driven transformation // *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 2006. V. 103. P. 6344–6349.
102. **Morris K.V., Rossi J.J.** Lentiviral-mediated delivery of siRNAs for antiviral therapy // *Gene Ther.* 2006. V. 13. P. 553–558.
103. **Mukherjee B., Morgenbesser S.D., DePinho R.A.** Myc family oncoproteins function through a common pathway to transform normal cells in culture: cross-interference by Max and trans-acting dominant mutants // *Genes Dev.* 1992. V. 6. P. 1480–1492.
104. **Nair S.K., Burley S.K.** X-ray structures of Myc-Max and Mad-Max recognizing DNA. Molecular bases of regulation by proto-oncogenic transcription factors // *Cell*. 2003. V. 112. P. 193–205.
105. **Napoli S., Negri U., Arcamone F., et al.** Growth inhibition and apoptosis induced by daunomycin-conjugated triplex-forming oligonucleotides targeting the *C-myc* gene in prostate cancer cells // *Nucleic Acids Res.* 2006. V. 34. P. 734–744.
106. **Negróni A., Scarpa S., Romeo A., et al.** Decrease of proliferation rate and induction of differentiation by a MYCN antisense DNA oligomer in a human neuroblastoma cell line // *Cell Growth Differ.* 1991. V. 2. P. 511–518.
107. **Nesbit C.E., Tersak J.M., Prochownik E.V.** Myc oncogenes and human neoplastic disease // *Oncogene*. 1999. V. 18. P. 3004–3016.
108. **Nieddu E., Melchiori A., Pescarolo M.P., et al.** Sequence specific peptidomimetic molecules inhibitors of a protein-protein interaction at the helix 1 level of c-Myc // *FASEB J.* 2005. V. 19. P. 632–634.
109. **Nilsson J.A., Cleveland J.L.** Myc pathways provoking cell suicide and cancer // *Oncogene*. 2003. V. 22. P. 9007–9021.
110. **Oates A.C., Bruce A.E., Ho R.K.** Too much interference: injection of double-stranded RNA has nonspecific effects in the zebrafish embryo // *Dev. Biol.* 2000. V. 224. P. 20–28.
111. **Oster S.K., Ho C.S., Soucie E.L., Penn L.Z.** The *myc* oncogene: Marvelously Complex // *Adv. Cancer Res.* 2002. V. 84. P. 81–154.
112. **Pai S.I., Lin Y.Y., Macaes B., et al.** Prospects of RNA interference therapy for cancer // *Gene Ther.* 2006. V. 13. P. 464–477.
113. **Pappas T.C., Bader A.G., Andruss B.F., et al.** Applying small RNA molecules to the directed treatment of human diseases: realizing the potential // *Expert. Opin. Ther. Targets*. 2008. V. 12. P. 115–127.
114. **Park I.H., Zhao R., West J.A., et al.** Reprogramming of human somatic cells to pluripotency with defined factors // *Nature*. 2008. V. 451. P. 141–146.
115. **Pastorino F., Brignole C., Marimpietri D., et al.** Targeted liposomal *C-myc* antisense oligodeoxynucleotides induce apoptosis and inhibit tumor growth and metastases in human melanoma models // *Clin. Cancer Res.* 2003. V. 9. P. 4595–4605.
116. **Pawlik C.A., Iyengar R.V., Krull E.J., et al.** Use of the ornithine decarboxylase promoter to achieve N-MYC-mediated overexpression of a rabbit carboxylesterase to sensitize neuroblastoma cells to CPT-11 // *Mol. Ther.* 2000. V. 1. P. 457–463.
117. **Pelengaris S., Khan M., Evan G.I.** Suppression of MYC-induced apoptosis in beta cells exposes multiple oncogenic properties of Myc and triggers carcinogenic progression // *Cell*. 2002. V. 109. P. 321–334.
118. **Pession A., Tonelli R.** The *mycN* oncogene as a specific and selective drug target for peripheral and central nervous system tumors // *Curr. Cancer Drug Targets*. 2005. V. 5. P. 273–283.
119. **Pession A., Tonelli R., Fronza R., et al.** Targeted inhibition of NMYC by peptide nucleic acid in *N-myc* amplified human neuroblastoma cells: cell-cycle inhibition with induction of neuronal cell differentiation and apoptosis // *Int. J. Oncol.* 2004. V. 24. P. 265–272.
120. **Pomeroy S.L., Tamayo P., Gaasenbeek M., et al.** Prediction of central nervous system embryonal tumour outcome based on gene expression // *Nature*. 2002. V. 415. P. 436–442.
121. **Ponzielli R., Katz S., Barsyte-Lovejoy D., Penn L.Z.** Cancer therapeutics: targeting the dark side of Myc // *Eur. J. Cancer*. 2005. V. 41. P. 2485–2501.
122. **Pooga M., Land T., Bartfai T., Langel U.** PNA oligomers as tools for specific modulation of gene expression // *Biomol. Eng.* 2001. V. 17. P. 183–192.
123. **Prochownik E.V.** c-Myc as a therapeutic target in cancer // *Expert. Rev. Anticancer Ther.* 2004. V. 4. P. 289–302.
124. **Prochownik E.V., Kukowska J., Rodgers C.** c-Myc antisense transcripts accelerate differentiation and inhibit G1 progression in murine erythroleukemia cells // *Mol. Cell Biol.* 1988. V. 8. P. 3683–3695.
125. **Ramsay G., Evan G.I., Bishop J.M.** The protein encoded by the human proto-oncogene *C-myc* // *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.* 1984. V. 81. P. 7742–7746.
126. **Resar L.M., Dolde C., Barrett J.F., Dang C.V.** B-MYC inhibits neoplastic transformation and transcriptional activation by c-MYC // *Mol. Cell Biol.* 1993. V. 13. P. 1130–1136.
127. **Reynolds C.P., Wang Y., Melton L.J., et al.** Retinoic acid-resistant neuroblastoma cell lines show altered MYC regulation and high sensitivity to fenretinide // *Med. Pediatr. Oncol.* 2000. V. 35. P. 597–602.
128. **Ricker J.L., Mata J.E., Iversen P.L., Gattone V.H.** *c-Myc* antisense oligonucleotide treatment ameliorates murine ARPKD // *Kidney Int.* 2002. V. 61. Suppl. 1. P. 125–131.
129. **Roussel M.F.** Key effectors of signal transduction and G1 progression // *Adv. Cancer Res.* 1998. V. 74. P. 1–24.
130. **Ruddell A., Mezquita P., Brandvold K.A., et al.** B lymphocyte-specific c-Myc expression stimulates early and functional expansion of the vasculature and lymphatics during lymphomagenesis // *Am. J. Pathol.* 2003. V. 163. P. 2233–2245.
131. **Schmidt E.V.** The role of c-Myc in regulation of translation initiation // *Oncogene*. 2004. V. 23. P. 3217–3221.
132. **Schwab M.** MycN in neuronal tumours // *Cancer Lett.* 2004. V. 204. P. 179–187.
133. **Seenisamy J., Bashyam S., Gokhale V., et al.** Design and synthesis of an expanded porphyrin that has selectivity for the c-MYC G-quadruplex structure // *J. Am. Chem. Soc.* 2005. V. 127. P. 2944–2959.
134. **Seoane J., Le H.V., Massague J.** Myc suppression of the p21(Cip1) Cdk inhibitor influences the outcome of the p53 response to DNA damage // *Nature*. 2002. V. 419. P. 729–734.
135. **Shachaf C.M., Kopelman A.M., Arvanitis C., et al.** MYC inactivation uncovers pluripotent differentiation and tumour dormancy in hepatocellular cancer // *Nature*. 2004. V. 431. P. 1112–1117.
136. **Shen L., Zhang C., Ambrus J.L., Wang J.H.** Silencing of human *C-myc* oncogene expression by poly-DNP-RNA // *Oligonucleotides*. 2005. V. 15. P. 23–35.
137. **Siddiqui-Jain A., Grand C.L., Bearss D.J., Hur-**

- ley L.H. Direct evidence for a G-quadruplex in a promoter region and its targeting with a small molecule to repress c-MYC transcription // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 2002. V. 99. P. 11593—11598.
138. Simonsson T., Henriksson M. c-Myc Suppression in Burkitt's lymphoma cells // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2002. V. 290. P. 11—15.
139. Sklar M.D., Prochownik E.V. Modulation of cis-platinum resistance in Friend erythroleukemia cells by *C-myc* // Cancer Res. 1991. V. 51. P. 2118—2123.
140. Smith J.B., Wickstrom E. Antisense *C-myc* and immunostimulatory oligonucleotide inhibition of tumorigenesis in a murine B-cell lymphoma transplant model // J. Natl. Cancer Inst. 1998. V. 90. P. 1146—1154.
141. Smith J.B., Wickstrom E. Inhibition of tumorigenesis in a murine B-cell lymphoma transplant model by *C-myc* complementary oligonucleotides // Adv. Exp. Med. Biol. 1998. V. 451. P. 17—22.
142. Song E., Zhu P., Lee S.K., et al. Antibody mediated *in vivo* delivery of small interfering RNAs via cell-surface receptors // Nat. Biotechnol. 2005. V. 23. P. 709—717.
143. Soucek L., Helmer-Citterich M., Sacco A., et al. Design and properties of a Myc derivative that efficiently homodimerizes // Oncogene. 1998. V. 17. P. 2463—2472.
144. Soucek L., Jucker R., Panacchia L., et al. Omomyc, a potential Myc dominant negative, enhances Myc-induced apoptosis // Cancer Res. 2002. V. 62. P. 3507—3510.
145. Soucek L., Nasi S., Evan G.I. Omomyc expression in skin prevents Myc-induced papillomatosis // Cell Death. Differ. 2004. V. 11. P. 1038—1045.
146. Stahel R.A., Zangemeister-Wittke U. Antisense oligonucleotides for cancer therapy—an overview // Lung Cancer. 2003. V. 41. Suppl. 1. P. S81—S88.
147. Staller P., Peukert K., Kiermaier A., et al. Repression of p15INK4b expression by Myc through association with Miz-1 // Nat. Cell Biol. 2001. V. 3. P. 392—399.
148. Stevenson M. Therapeutic potential of RNA interference // N. Engl. J. Med. 2004. V. 351. P. 1772—1777.
149. Stubdal H., Perin N., Lemmon M., et al. A prodrug strategy using ONYX-015-based replicating adenoviruses to deliver rabbit carboxylesterase to tumor cells for conversion of CPT-11 to SN-38 // Cancer Res. 2003. V. 63. P. 6900—6908.
150. Sun L., Fuselier J.A., Murphy W.A., Coy D.H. Antisense peptide nucleic acids conjugated to somatostatin analogs and targeted at the *N-myc* oncogene display enhanced cytotoxicity to human neuroblastoma IMR32 cells expressing somatostatin receptors // Peptides. 2002. V. 23. P. 1557—1565.
151. Takahashi K., Tanabe K., Ohnuki M., et al. Induction of pluripotent stem cells from adult human fibroblasts by defined factors // Cell. 2007. V. 131. P. 861—872.
152. Vafa O., Wade M., Kern S., et al. c-Myc can induce DNA damage, increase reactive oxygen species, and mitigate p53 function: a mechanism for oncogene-induced genetic instability // Mol. Cell. 2002. V. 9. P. 1031—1044.
153. van Waardenburg R.C., Prins J., Meijer C., et al. Effects of *C-myc* oncogene modulation on drug resistance in human small cell lung carcinoma cell lines // Anticancer Res. 1996. V. 16. P. 1963—1970.
154. Wagner L.M., Guichard S.M., Burger R.A., et al. Efficacy and toxicity of a virus-directed enzyme prodrug therapy purging method: preclinical assessment and application to bone marrow samples from neuroblastoma patients // Cancer Res. 2002. V. 62. P. 5001—5007.
155. Wang Y.H., Liu S., Zhang G., et al. Knockdown of *c-myc* expression by RNAi inhibits MCF-7 breast tumor cells growth *in vitro* and *in vivo* // Breast Cancer Res. 2005. V. 7. P. R220—R228.
156. Watt F.M., Frye M., Benitah S.A. MYC in mammalian epidermis: how can an oncogene stimulate differentiation? // Nat. Rev. Cancer. 2008. V. 8. P. 234—242.
157. Wechsler D.S., Shelly C.A., Petroff C.A., Dang C.V. MXI1, a putative tumor suppressor gene, suppresses growth of human glioblastoma cells // Cancer Res. 1997. V. 57. P. 4905—4912.
158. Whitesell L., Rosolen A., Neckers L.M. *In vivo* modulation of N-myc expression by continuous perfusion with an antisense oligonucleotide // Antisense Res. Dev. 1991. V. 1. P. 343—350.
159. Wickstrom E.L., Bacon T.A., Gonzalez A., et al. Human promyelocytic leukemia HL-60 cell proliferation and c-myc protein expression are inhibited by an antisense pentadecadeoxynucleotide targeted against c-myc mRNA // Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1988. V. 85. P. 1028—1032.
160. Wu R., Lin L., Beer D.G., et al. Amplification and over expression of the *L-myc* proto-oncogene in ovarian carcinomas // Am. J. Pathol. 2003. V. 162. P. 1603—1610.
161. Yin X., Giap C., Lazo J.S., Prochownik E.V. Low molecular weight inhibitors of Myc-Max interaction and function // Oncogene. 2003. V. 22. P. 6151—6159.
162. Zamore P.D., Tuschl T., Sharp P.A., Bartel D.P. RNAi: double-stranded RNA directs the ATP-dependent cleavage of mRNA at 21 to 23 nucleotide intervals // Cell. 2000. V. 101. P. 25—33.
163. Zervos A.S., Gyuris J., Brent R. Mxi1, a protein that specifically interacts with Max to bind Myc-Max recognition sites // Cell. 1993. V. 72. P. 223—232.
164. Zupi G., Scarsella M., Semple S.C., et al. Antitumor efficacy of *bcl-2* and *c-myc* antisense oligonucleotides in combination with cisplatin in human melanoma xenografts: relevance of the administration sequence // Clin. Cancer Res. 2005. V. 11. P. 1990—1998.